

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AMOL

Perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Amol musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je AMOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMOL používat
3. Jak se AMOL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak AMOL uchovávat
6. Další informace

1. CO JE AMOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

AMOL patří do skupiny rostlinných přípravků (fytofarmak), podskupina karminativum (lék proti nadýmání), spasmolytikum (lék uvolňující křeče), derivancia (látky užívané se místně k zvýšenému prokrvení a urychlující průběh zánětu, zrychlují vstřebávání otoku).

AMOL je směs silic v lihovém roztoku. Při vnitřním užívání mírní nadýmání a křeče zažívacího traktu, při zevním použití zvyšuje prokrvení kůže a podkoží.

Vnitřně se používá při mírných pocitech nevolnosti a k podpoře trávení, při nachlazení a kašli. Zevně při svalových bolestech revmatického původu, ischiasu a neuralgiích (bolesti nervového původu).

Při výskytu příznaků onemocnění jako jsou kožní změny nebo dýchací potíže je potřeba vyhledat lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMOL POUŽÍVAT

Nepoužívejte AMOL

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
- jestliže máte astma nebo jiné onemocnění dýchacích cest, které souvisí s přecitlivělostí dýchacích cest.
- jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy

- nepoužívejte AMOL vnitřně jestliže máte ucpané žlučové cesty, zánět žlučníku, těžké poškození jater, epilepsii a pokud konzumujete nadměrně alkohol.
- vnitřně nesmí se podávat dětem do 12 let a zevně dětem mladším 4 let

Zvláštní opatření při použití přípravku AMOL je zapotřebí

- jestliže trpíte žlučnickovými kameny

Před začátkem užívání přípravku se poradte s lékařem a to i tehdy, jestliže se u Vás toto onemocnění vyskylo v minulosti.

- nepoužívejte Amol na popáleniny, ekzémy a poškozenou pokožku, zvláště pak ne na otevřené rány, u kožních onemocnění, u dětí s exanthemem
- nepoužívejte na sliznice a v okolí očí a nosu

Po nanesení přípravku si důkladně umyjte ruce.

Použití u dětí

Pro vnitřní užívání přípravku u dětí nejsou k dispozici dostatečné údaje. AMOL nesmí užívat vnitřně děti do 12 let.

Pro vnější použití nejsou k dispozici data u kojenců a malých dětí do 4 let. AMOL proto nesmí být používán zevně u kojenců a dětí do 4 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Dosud nebylo zaznamenáno vzájemné působení přípravku AMOL s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pro použití přípravku AMOL v těhotenství a období kojení nejsou k dispozici dostatečné údaje. Proto se AMOL nedoporučuje pro těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Možnost ovlivnění při dodržení doporučeného dávkování a způsobu užití je nepravděpodobná.

Důležité informace o některých složkách přípravku AMOL

Tento léčivý přípravek obsahuje 68 % obj. alkoholu, tj. do 434 mg v jedné dávce (15 kapek), což odpovídá do 11 ml piva, 4,6 ml vína.

Je škodlivý pro alkoholiky.

Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií (viz též odstavec Nepoužívejte Amol...).

3. JAK SE AMOL POUŽÍVÁ

Vždy používejte AMOL přesně podle pokynů v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

U dospělých a dětí nad 12 let se AMOL používá vnitřně i zevně u dětí od 4 let pouze zevně. Při zevním použití přípravku se nesmí na postižené místo přikládat neprodyšné obklady a místo se nesmí současně zahřívat.

Dávkování a způsob použití

Vnitřní použití

10 – 15 kapek na kostku cukru, případně do ½ sklenice vody nebo čaje a vypijte.

Zevně

Použije se nezředěný AMOL.

Při použití nezředěného roztoku se AMOL vtírá na postižené místo dokud není pokožka suchá.

1 g roztoku je 21 kapek

Jestliže jste užil(a) více přípravku AMOL, než jste měl(a)

Pro případ předávkování je třeba mít na zřeteli obsah alkoholu v přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít AMOL

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i AMOL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U citlivých osob se může vyskytnout podráždění žaludku. Jako u všech éterických olejů může AMOL zesílit podráždění pokožky nebo sliznic. Může se objevit dráždění ke kašli nebo bronchospasmus nebo se tyto příznaky mohou zhoršit.

Je možný výskyt kontaktních ekzémů a/nebo reakce z přecitlivělosti.

V těchto případech AMOL vysaďte a vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Také v těchto případech AMOL vysaďte.

5. JAK AMOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. AMOL obsahuje 68 obj.-% lihu.

Přípravek AMOL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření spotřebujte AMOL do 12 měsíců.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co AMOL obsahuje

- Léčivými látkami jsou

Menthae piperitae etheroleum	0,24	g
Citronellae etheroleum	0,1	g
Caryophylli floris etheroleum	0,1	g
Cinnamomi zeylanici corticis etheroleum	0,24	g
Lavandulae etheroleum	0,24	g
Citri etheroleum	0,57	g
Mentholum	1,723	g

ve 100 g přípravku.

1 g přípravku = 21 kapek

- Pomocnými látkami jsou

ethanol 96% (V/V), čištěná voda

Jak AMOL vypadá a co obsahuje toto balení

AMOL je čirá bezbarvá tekutina lihové chutě a vůně v lahvičce z čírého skla se šroubovacím uzávěrem nebo šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem pro první otevření a kapací vložkou.

Velikost balení

5 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml.

Všechny velikosti balení nemusí být přítomné na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda GmbH
78467 Konstanz, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
26.4.2013